

LEARN *with* LILLY:

Tehostettu rintasyövän adjuvanttihoito potilaan ja lääkärin arjessa – Tietoa, näkökulmia ja käytännön ratkaisuja

Torstaina 16.4.2026
Helsingin Radisson Blu Royal -hotelli
klo 16:45-19:40

Lämpimästi tervetuloa Lillyn järjestämään presymposiumiin. Tilaisuus on tarkoitettu lääkäreille ja siihen voi osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä. Koulutusosuuden jälkeen tarjollaan paikan päällä osallistuville illallinen.

Ohjelma

16:45–17:30	Rekisteröityminen ja välipala
17:30–17:35	Presymposiumin avaus
17:35–18:15	Keynote: Jaksamisen merkitys hoidon onnistumisessa Minna Jääskeläinen , Ylilääkäri, LKS syöpätautien pkl ja palliatiivinen keskus
18:20–18:40	Nostoja monarchE-tutkimuksen laajasta datasta Merja Auvinen , Lilly
18:45–19:35	Paneelikeskustelu: Haasteet ja ratkaisut varhaisvaiheen rintasyöpäpotilaan tehostetussa hormonaalisessa adjuvanttihoitossa puheenjohtajana Meri Utriainen , Ylilääkäri, HUS Operatiiviset palvelut
19:35–19:40	Presymposiumin lopetus
19:45–21:00	Illallinen

Ilmoittaudu mukaan

Paikan päälle:

Ilmoittaudu **tästä linkistä** tai skanna QR-koodi rekisteröitymiseen.
Ilmoittaudu viimeistään ti 31.3.2026 mennessä.

Livestriimiin:

Ota yhteyttä Petra Nykäseen (petra.nykanen@lilly.com) saadaksesi rekisteröitymislinkin livestriimiin.



meetings.lilly.com/event/Lillypresymposium2026

Matkajärjestelyt: Lilly järjestää tarvittaessa lennot, juna- tai linja-automatkat sekä yhden hengen majoituksen Uudenmaan ulkopuolelta tuleville osallistujille. Osallistuja huolehtii itse kotipaikkakunnalla syntyvistä matkakustannuksista. Kilometrikorvauksia ja pysäköintikuluja emme hyvitä. Muistathan perua ilmoittautumisesi presymposiumiin, mikäli et pääse osallistumaan.



Keynote

Presymposiumin keynote-luennon pitää **Minna Jääskeläinen**. Luento käsittelee jaksamisen merkitystä hoidon onnistumisessa ja tarjoaa näkökulmia sekä lääkärin arjen voimavaroihin että potilaan koemaan fatiikkiin.

Paneelikeskustelu



Paneelikeskustelussa onkologian asiantuntijat käsittelevät varhaisvaiheen rintasyövän hoitoa korkean uusiutumiskiriskin tilanteissa. Keskustelu tarjoaa käytännön näkökulmia potilaan kohtaamiseen, hoitoon ohjaamiseen ja sitouttamiseen. Teemoina myös mm. hankalien asioiden puheeksi ottaminen, rutiinien merkitys ja kokonaisuudessaan sanoittaminen. Paneelin puheenjohtajana toimii **Meri Utriainen**.

Lämpimästi tervetuloa



Mariam Nurminen

Senior Brand Manager,
Oncology
mariam.nurminen@lilly.com



Merja Auvinen

Senior Director Medical Affairs,
Oncology
auvinen_merja@lilly.com

Verzenios® (abemasiklibi) 50 mg, 100 mg ja 150 mg kalvopäällysteinen tabletti

Käyttöaiheet: *Varhaisvaiheen rintasyöpä:* Tarkoitettu käytettäväksi adjuvanttihoitona hormonaalisen hoidon kanssa aikuispotilaille, joilla on hormoni-reseptoripositiivinen, HER2-negatiivinen, imusolmukkeisiin levinnyt varhaisvaiheen rintasyöpä, jonka uusiutumiskiriski on suuri. Pre- tai perimenopausaalisilla naisilla hormonaalinen aromataasin estäjähoito on yhdistettävä LHRH-agonistin kanssa. *Paikallisesti edennyt tai etäpesäkkeinen rintasyöpä:* Tarkoitettu käytettäväksi naisille, joilla on hormoni-reseptoripositiivinen, HER2-negatiivinen paikallisesti edennyt tai etäpesäkkeinen rintasyöpä, yhdessä aromataasin estäjän tai fulvestrantin kanssa ensimmäisenä hormonaalisena hoitona tai naisille, jotka ovat saaneet aiemmin hormonaalista hoitoa. Pre- tai perimenopausaalisilla naisilla hormonaalinen hoito on yhdistettävä LHRH-agonistin kanssa. **Annostus ja antotapa:** Hoidon aloittaa ja sitä valvoo lääkäri, jolla on kokemusta syöpähoitojen toteuttamisesta. Täydellistä veren kuvaa seurataan ennen hoidon aloittamista, 2 viikon välein ensimmäisten 2 kk:n ajan, kerran kuukaudessa seuraavien 2 kk:n ajan ja kliinisen tarpeen mukaan. Ennen hoidon aloittamista on suositeltavaa, että absoluuttinen neutrofiilimäärä (ANC) on $\geq 1,5 \times 10^9/l$, trombosyyttiarvo on $\geq 100 \times 10^9/l$ ja hemoglobiiniarvo on $\geq 80 \text{ g/l}$. **Annostus:** Abemasiklibin suositusannos on 150 mg kahdesti vuorokaudessa yhdistettynä hormonaaliseen hoitoon. Samanaikaisesti käytettävän hormonaalisen valmisteen suositusannostus, ks. kyseisen valmisteen valmisteyhteenveto. **Hoidon kesto:** *Varhaisvaiheen rintasyöpä:* Käytetään jatkuvasti kahden vuoden ajan tai kunnes sairaus uusiutuu tai ilmenee toksisuutta, joka ei ole hyväksyttävää. *Paikallisesti edennyt tai etäpesäkkeinen rintasyöpä:* Käytetään jatkuvasti niin kauan kuin potilas hyötyy siitä kliinisesti tai kunnes ilmenee toksisuutta, joka ei ole hyväksyttävää. Jos potilas oksentaa tai Verzenios-annos jää väliin, uutta annosta ei pidä ottaa, vaan potilasta kehoitetaan ottamaan seuraava annos tavanomaiseen aikaan. **Annosmuutokset:** Joidenkin haittavaikutusten hoito (mm. ripuli ja hematologinen toksisuus) voi edellyttää hoidon tauottamista ja/tai annoksen pienentämistä tai hoito tulee lopettaa kokonaan (ks. valmisteyhteenveto). **Antotapa:** Suun kautta, tabletti nielläään kokonaisuena samaan aikaan joka päivä, voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa. **Vasta-aiheet:** Yliherkkyys abemasiklibille tai apuaineille. **Varoitukset ja käyttöön liittyvät varoitukset:** Abemasiklibia saavilla potilailla on ilmoitettu neutropeniaa. Potilaita on neuvottava ilmoittamaan kaikista kuumejaksoista. Potilaita on seurattava infektioiden, syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian merkkien ja oireiden varalta ja hoidettava asianmukaiseen tapaan. Tromboembolisen laskimotapahtuman asteesta riippuen abemasiklibin annosta voi olla tarpeen muuttaa. Tromboembolisia valtimotapahtumia on ilmoitettu metastoittavista rintasyöpästä sairastavilla. Abemasiklibia saavilla potilailla on ilmoitettu ALAT- ja ASAT-arvojen nousua. Yleisin haittavaikutus on ripuli, johon voi liittyä nestehukkaa. Potilaiden on aloitettava ripulilääkkeen, kuten loperamidin, käyttö heti ensimmäisen löysän ulosteen ilmetessä, lisättävä nesteiden nauttimista ja ilmoitettava oireista terveydenhuollon ammattilaiselle. Interstitiaalista keuhkosairautta/keuhkokuumetta on ilmoitettu abemasiklibia saavilla potilailla. Abemasiklibin tehosta ja turvallisuudesta ei ole tietoa potilailla, joilla on viskeraalinen kriisi. Potilaiden, joilla on perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä. CYP3A4:n induktorien samanaikaista käyttöä on vältettävä, sillä yhdistelmän käyttöön liittyy abemasiklibin tehon heikkenemisen riski. **Yhteisvaikutukset:** Abemasiklibi metaboloituu lähinnä CYP3A4-välitteisesti. Vahvojen CYP3A4:n estäjien ja abemasiklibin samanaikaista käyttöä on vältettävä. Annosmuutos ei ole tarpeen potilailla, jotka käyttävät keskivahvoja tai heikkoja CYP3A4:n estäjiä. Potilaita tulee kuitenkin seurata tarkasti toksisuuden merkkien varalta. Greippiä ja greippimehua on vältettävä. Kliinisessä lääkeaineinteraktiotutkimuksessa, jossa metformiinia annettaessa yhdessä abemasiklibin (400 mg) kanssa, todettiin plasman metformiiniaktiivisuuden suurenevan hieman (ei kliinisesti merkittävästi). **Raskaus ja imetus:** Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä erittäin tehokkaita ehkäisymenetelmiä (esim. kahta estemenetelmää) hoidon aikana ja vähintään 3 viikon ajan hoidon päättymisen jälkeen. Abemasiklibin käyttöä ei suositella raskauden aikana. Abemasiklibia saavien potilaiden ei pidä imettää. **Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn:** Vähäinen vaikutus. Potilaita on kehoitettava olemaan varovaisia ajaessaan autoa tai käyttäessään koneita, jos heillä on uupumusta tai huimausta. **Haittavaikutukset:** Yleisimmän esiintyvien haittavaikutuksia ovat ripuli, infektiot, neutropenia, leukopenia, anemia, uupumus, pahoinvointi, oksentelu, hiustenlähtö ja ruokahalun heikentyminen. Yleisimpien haittavaikutusten osalta asteen ≥ 3 tapahtumia oli $< 5\%$ (pois lukien neutropenia, leukopenia ja ripuli). Ks. muut haittavaikutukset valmisteyhteenveto. **Lisätiedot:** Valmisteyhteenveto sekä Lilly MedInfo 0800 140 240 (arkisin klo 9-15). **Pakkaukset ja hinnat (vmh sis. alv) ja korvattavuus:** Verzenios® 50 mg, 100 mg ja 150 mg 56 kalvopäällysteistä tablettia läpipainopakkauksessa 2402,33 €. Reseptilääke. *Varhaisvaiheen rintasyöpä ja paikallisesti edennyt tai etäpesäkkeinen rintasyöpä:* Rajoitetusti peruskorvattava ja rajoitetusti erityiskorvattava (ylempi erityiskorvattavuus 100 %). **Markkinoija:** Oy Eli Lilly Finland Ab. Pohjautuu viimeisimpään valmisteyhteenvetoon. CMAT-07792 01/2026.